

Se protéger et protéger sa famille de la **PESTE**

- ▶ Se rendre impérativement et immédiatement au centre de santé (CSB) en cas de **signes suspects** ou dès l'apparition de **signes douteux**
- ▶ Le **traitement contre la Peste existe** et est très **efficace**
- ▶ Le traitement est **gratuit** et normalement **disponible** au niveau des formations sanitaires (CSB)



Important à SAVOIR


- ▶ La Peste est une maladie grave. Il faut la traiter rapidement pour guérir le malade
- ▶ Le **diagnostic** de la peste **se fait seulement** au niveau des **formations sanitaires (Centre de santé de base - CSB)** pour éviter la confusion avec d'autres maladies
- ▶ Les médicaments anti-pesteux sont **gratuits** et sont normalement **disponibles** au niveau des formations sanitaires (CSB). Les malades bien soignés guérissent sans problème
- ▶ Il faut demander conseil aux professionnels de la santé car l'automédication est **dangereuse**, car elle peut créer une résistance aux antibiotiques et empêcher l'efficacité d'un traitement médicamenteux
- ▶ Les deux principales formes de peste sont : la **peste bubonique** qui se transmet par la piqure d'une **puce infectée** et la **peste pulmonaire** qui se transmet par le **contact avec une personne** malade de la peste
- ▶ Toute personne ayant été en contact étroit (moins de 2 mètres) avec un malade de peste pulmonaire est appelée «**contact**» et doit aussi **être protégée** par une médication appropriée
- ▶ Un malade de peste pulmonaire qui a commencé le traitement antibiotique **correct** cesse d'être contagieux à partir du **3^{ème} jour de traitement**

Peste bubonique



Signes cliniques de peste bubonique

grosseur douloureuse au niveau d'une aire ganglionnaire (cou, aisselle, racine de la cuisse) et sans plaies, accompagnée de fièvre



La Peste Bubonique est **transmise** par le **rat malade** de la peste via la piqure d'une **puce infectée**

Peste pulmonaire



Signes cliniques de peste pulmonaire

forte toux, crachat sanguinolent, forte fièvre, douleur au niveau du thorax, difficulté à respirer



La Peste Pulmonaire est **transmise** par **inhalation** des particules émanant du malade (d'homme à homme)

Les mesures de PREVENTION

- ▶ **Éliminer** les **puces** dans les habitations
- ▶ **Garder** la maison et ses alentours **propres**, ne pas jeter les débris partout mais uniquement dans les **poubelles appropriées**, pour éviter la **prolifération des rats**
- ▶ **Laver** régulièrement vos mains avec de l'eau et du savon

-
- ▶ **Avant d'entreprendre** certains **rites funéraires**, prendre conseils pour les précautions à prendre quand une personne est décédée de la peste
 - ▶ **Éviter** de manipuler des cadavres de rats et d'humains
 - ▶ **Se protéger** contre les piqûres de puces

Les mesures de TRAITEMENT

- ▶ Se rendre impérativement et immédiatement au centre de Santé (CSB) en cas de **signes suspects** ou dès l'apparition de **signes douteux** tel que de fortes fièvres, des grosseurs douloureuses au niveau des ganglions, des toux, et des crachats sanguinolents, des douleurs thoraciques
- ▶ Les centres de santé (CSB) ont normalement les **capacités** et les **ressources nécessaires** pour traiter **gratuitement** la **Peste**. Le **traitement existe** et est **très efficace**.
- ▶ Après un déplacement dans une **zone endémique**, en particulier au cours d'une épidémie déclarée, consulter immédiatement le centre de santé ou tout autre professionnel de santé si présence d'un ou plusieurs symptômes évocateurs de la maladie





En cas de doute, pour plus d'informations:
appelez **GRATUITEMENT**

